مذكرة المعلومات
تنظير المعدة ،تنظير القولون

الاستطبابات

هذا الفحص يسمح برؤية المريء والمعدة والجزء الأول من الأمعاء (الاثني عشر). في الوقت الحالي لا يوجد فحص أفضل لرؤية هذه الأجزاء من الجسم.

يشار إلى الفحص من أجل الحصول بسرعة على تشخيص دقيق من أجل تنفيذ العلاج الأنسب.

يمكن للطبيب ، إذا لزم الأمر أثناء التحقيق ، سحب قطع صغيرة جدًا من النسيج دون ألم لإجراء تحليل أكثر عمقًا تحت المجهر (الخزعة).

التحضير

يجب أن تكون معدتك فارغة لا تأكل وتشرب من منتصف الليل قبل يوم الاختبار (الصيام) إذا تم إجراء الاختبار في فترة ما بعد الظهر ، يمكن فقط تناول وجبة إفطار خفيفة في الصباح الباكر قبل الساعة 8.00 . إذا كان من اللازم عليك تناول الدواء فقم بشرب رشفات صغيرة من الماء فقط.

طريقة التنفيذ

يتم إجراء الفحص عن طريق تمرير أنبوب صغير ومرن من خلال الفم .سيكون من الضروري إزالة النظارات والعدسات اللاصقة وأطراف الأسنان الاصطناعية.

قبل الفحص سيتم إجراء تخدير في تجويف الفم باستخدام رذاذ .وهو مخدر موضعي يشبه ذلك المستخدم من قبل طبيب الأسنان لتخدير اللثة وبالتالي من المهم أن تشير إذا سبقت ان حدثت لك مشاكل مع هذا النوع من التخدير.
هذه المادة لها طعم مر يمكن أن تعطي لك انطباعا بأنه "مغلق في الحلق" .

سيتم إعطائك **مهدئًا** في الوريد إذا كنت ترغب في ذلك ، و الذي **سيقلل من قلقك دون الذهاب إلى النوم** وسيسمح لك بمزيد من الراحة أثناء الاختبار.
في هذه الحالة ، يجب أن تكون مصحوبًا بشخص قادر على القيادة ، على أي حال من قِبل شخص بالغ و مسؤول ، لأن المسكّن يهدّد سلامة السائق خلال الساعات التالية بعد الإختبار.

بسبب التأثير المهدئ للأدوية التي يتم إعطاؤها ، سيكون من الضروري الاستراحة لمدة 6 ساعات، وخلالها لن تضطر إلى القيادة ، أو ركوب الدراجة ، أو القيام بأنشطة أخرى يحتمل أن تكون خطرة.

في وضعية مريحة و في غرفة خاصة، ومستلقي على الجانب الأيسر، سوف يقوم الطبيب بتمرير الجهاز عن طريق الفم والحلق (إشنركل سيحمي أسنانك).

لن يمنعك الجهاز من التنفس ولن يسبب لك أي ألم .يمكن أن تشعر فقط بالحاجة إلى طرد الهواء من المعدة ، الهواء الذي يتم إدخاله أثناء الإختبار من أجل تمديد جدران الأمعاء.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST
SEDE LEGALE: Via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG) Tel. 035.3061.1 Fax 035.3063715
www.asst-bergamoest.it P.IVA/C.F. 04114380167

يستمر الاختبار حوالي 5-10 دقائق.

قبل الاختبار سوف تضع مشبك صغير على إصبعك، دون سحقه وهو الجهاز الذي يسمح لموظفين الغرفة بمراقبة الأوكسجين في الدم وضربات قلبك.

في الوقت الحاضر لا توجد طرق تشخيصية بديلة لـ EGDS (المريء ومعي الاثنا عشر ، تنظير المعدة)، لها نفس الحساسية والخصوصية لتشخيص الأمراض العضوية في الأطراف الأولى للجهاز الهضمي.

عادة ما يكون الاستطلاع مقبولاً بشكل جيد ولا يمثل مخاطر كبيرة حتى إذا تم إجراؤه جيداً وبأيدٍ خبيرة على الأطفال أو في الأشخاص الضعاف.

وتتمثل المضاعفات الرئيسية و على الرغم من وجود نسبة منخفضة للغاية تقدر بـ 0.13 ٪ تتمثل في ثقب و في نزيف و في مضاعفات تنفسية و قلبية.