

RICERCA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE IN TAMPONE VAGINALE E RETTALE

MATERIALE NECESSARIO PER LA RACCOLTA

N° 2 kit per la raccolta ciascuno composto da contenitore con terreno di trasporto (Amies) e tampone (bastoncino tipo cotton-fioc) forniti dal centro Prelievi o acquistabili in farmacia.



INDICAZIONI E MODALITA' DI RACCOLTA

I tamponi possono essere eseguiti autonomamente dalla paziente, seguendo le seguenti indicazioni

Tampone vaginale

1. Prima di eseguire eventuali lavaggi vaginali, inserire il tampone (bastoncino tipo cotton-fioc) in vagina per 2-3 cm e ruotarlo per raccogliere il liquido vaginale.
2. Inserire il tampone nel contenitore con il terreno di trasporto facendo in modo che la parte cotonata sia immersa nella parte gelatinosa (terreno di trasporto). L'impugnatura del tampone funziona da tappo per il contenitore.
3. Scrivere sull'etichetta del contenitore i dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita).

Tampone rettale

1. Introdurre nell'ano per circa 1 cm il tampone (bastoncino tipo cotton-fioc) e ruotarlo per farlo sporcare di feci.
2. Inserire il tampone nel contenitore con il terreno di trasporto facendo in modo che la parte cotonata sia immersa nella parte gelatinosa (terreno di trasporto). L'impugnatura del tampone funziona da tappo per il contenitore.
3. Scrivere sull'etichetta del contenitore i dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita).

Consegnare entrambi i tamponi al Centro Prelievi **entro 24 ore** dalla raccolta conservandoli a temperatura ambiente (20-24° C).