

## **CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI OSTETRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI**

### **CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA:**

La Commissione predispone, seduta stante, per la prova scritta tre batterie di prove contenenti ciascuno 15 domande, ai sensi dell'art. 12 comma 1) del D.P.R. nr. 220/01 e così denominate:

*Prova Scritta n.1: "Vedi allegato"*

*Prova scritta n. 2: "Vedi allegato"*

*Prova scritta n. 3: "Vedi allegato" (prova estratta)*

1. La prova consiste nella soluzione di n. 15 quesiti a risposta multipla, con 4 alternative di risposta di cui solo una esatta;
2. Ad ogni risposta errata, omessa o multipla non verrà attribuito alcun punteggio;
3. La sufficienza si ottiene conseguendo il punteggio minimo di 21/30, ossia rispondendo correttamente a 9 quesiti su 15;  
si riporta di seguito la griglia di attribuzione dei punteggi:

<i>risposta</i>	<i>punti</i>
1	1,91
2	4,67
3	7,00
4	9,33
5	11,67
6	14,00
7	16,33
8	18,67
9	21,00
10	22,50
11	24,00
12	25,50
13	27,00
14	28,50
15	30,00

### **CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA:**

Per la prova pratica la Commissione predispone tre batterie di prove contenenti 10 domande ciascuno ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.R. e così denominate:

*Prova Pratica n.1 : "Vedi allegato"*

*Prova Pratica n.2 : "Vedi allegato" (prova estratta)*

*Prova Pratica n. 3: "Vedi allegato" (prova estratta)*

1. La prova consiste nella soluzione di n. 10 quesiti ciascuno a risposta multipla con 4 alternative di risposta;
2. Ad ogni risposta errata o omessa non verrà attribuito alcun punteggio;
3. La sufficienza si ottiene conseguendo il punteggio minimo di 14/20, ossia rispondendo correttamente a 6 quesiti su 10;  
si riporta di seguito la griglia di attribuzione dei punteggi:

<i>risposta</i>	<i>punti</i>
1	2,33
2	4,67
3	7,00
4	9,33
5	11,67
6	14,00
7	15,50
8	17,00
9	18,50
10	20,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE:**

La Commissione ha stabilito di sottoporre ai candidati le medesime domande per ciascun gruppo. Pertanto predispone n. 5 buste contenenti n. 2 domande nell'ambito del profilo, una frase in lingua inglese da tradurre ed un quesito di informatica, di modo che estratte le prove dei candidati convocati nei primi 2 gruppi possa rimanere la terna per i candidati dell'ultimo turno

Le prove sono denominate da **PROVA ORALE N. 1 A PROVA ORALE N. 5** (vedi allegati).

Il punteggio verrà attribuito ai candidati con voti palesi, a seguito di ponderata valutazione fatta sulla base dei seguenti **criteri di valutazione atti al raggiungimento dei seguenti punteggi di idoneità:**

- punti 14: Il candidato risponde al quesito estratto in modo sufficiente
- punti 15: Il candidato risponde al quesito estratto in modo più che sufficiente
- punti 16: Il candidato risponde al quesito estratto in modo corretto e con esposizione chiara
- punti 17: Il candidato risponde al quesito estratto in modo in modo corretto e chiaro e conciso
- punti 18: Il candidato risponde al quesito estratto in modo chiaro arricchendo i contenuti con argomentazioni pertinenti
- punti 19: Il candidato risponde al quesito estratto in modo chiaro e completo rimarcando le priorità e cogliendo pienamente il senso della domanda

punti 20: Il candidato risponde al quesito estratto in modo eccellente rimarcando le priorità e cogliendo pienamente il senso della domanda

Per i candidati che risulteranno aver conseguito un punteggio inferiore a 14/20 la commissione decide di adottare i seguenti criteri:

punti 0: Il candidato non risponde al quesito estratto

punti da 1 a 13 Il candidato risponde al quesito estratto stentatamente e con errori gravi.


Le prove di inglese e di informatica sono ricomprese nella prova orale in termini di mero accertamento della relativa conoscenza.

Il superamento della prova è subordinato - come previsto dall'art. 14 del medesimo D.P.R. - al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno **14/20**.

Seriate 22/03/2024

Il Presidente  
*Paris Dr.ssa Serena*

Prav  
19/3/24

NON EST NATIA  




### PROVA SCRITTA N. 1

Quesito n. 1	Risposta
<b>QUALE DI QUESTE AFFERMAZIONI E' FALSA IN RIFERIMENTO AL VACCINO PER LA PERTOSSE?</b>	
Il richiamo DTP deve essere ripetuto ad ogni gravidanza, anche se a breve distanza tra loro	A
Le titolazioni antigeniche per Pertosse sono indicate per decidere l'effettuazione della vaccinazione	B
Il richiamo DTP è indipendente da qualsiasi altra dose contenente uno o più antigeni contenuti nel vaccino.	C
Il richiamo deve essere effettuato idealmente tra la 27° e la 36° settimana. In caso di presentazione della gravida oltre questo termine è comunque possibile vaccinare	D
<b>Quesito n. 2</b>	<b>Risposta</b>
<b>SECONDO LE LG SIN RIANIMAZIONE NEONATALE 2020-2025, NECESSITA DELLE SOLE CURE DI ROUTINE (FORNIRE CALORE, ASCIUGARE, VALUTAZIONE CONTINUA) IL NEONATO CHE:</b>	
Nasce a termine di gravidanza, con liquido amniotico chiaro e frequenza cardiaca regolare	A
Nasce a termine di gravidanza, con liquido amniotico chiaro, respira o piange	B
Nasce a termine di gravidanza, ha un buon tono muscolare e frequenza cardiaca regolare	C
Nasce a termine di gravidanza, ha un buon tono muscolare, respira o piange	D
<b>Quesito n. 3</b>	
<b>IL TEST COMBINATO CONSISTE NEL CALCOLO:</b>	<b>Risposta</b>
Del rischio di avere un feto affetto da una patologia genetica ereditaria	A
Del rischio di avere un diabete gestazione nel primo trimestre	B
Del rischio di avere un neonato con la sindrome di down e di Klinefelter	C
Del rischio di avere un feto affetto da T21 mediante la combinazione dei valori della NT con il dosaggio sul siero materno nel primo trimestre di gravidanza della frazione beta libera dell'hCGG (freeβhCGG) e della proteina plasmatica A associata alla gravidanza (PAPP-A)	D
<b>Quesito n. 4</b>	<b>Risposta</b>
<b>SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DELL'OMS, LE POSSIBILI MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE INFANTILE SONO DEFINITE COME SEGUE: (EPICENTRO/ISS/ALLATTAMENTO DEFINIZIONI):</b>	
Allattamento esclusivo, nutrizione mista, nutrizione artificiale	A
Allattamento esclusivo, allattamento predominante, allattamento complementare, non allattamento	B
Allattamento esclusivo, allattamento misto, allattamento artificiale	C
Allattamento esclusivo, possibile integrazione di acqua	D
<b>Quesito n. 5</b>	<b>Risposta</b>
<b>LA CAFFEINA PUÒ INCIDERE SUL RISCHIO DI ABORTO SPONTANEO E NEONATI SGA ALLA NASCITA (WHO RECOMMENDATIONS ON ANTENATAL CARE FOR A POSITIVE PREGNANCY EXPERIENCE, 2016):</b>	
No, la caffeina non incide sull'andamento della gravidanza quindi il suo consumo rimane legato al desiderio della donna	A
Si, la caffeina è da evitare in gravidanza, al pari dell'alcool non esiste una dose soglia	B
Si, quindi si consiglia di ridurre il consumo della caffeina almeno a 300 mg/die	C
Si, quindi si consiglia di ridurre l'assunzione di caffeina sotto i 100 mg /die	D

## PROVA SCRITTA N. 1

<b>Quesito n. 6</b>	<b>Risposta</b>
<b>L'OSTETRICA RICONOSCE LA FASE DEL TRAVAGLIO ATTIVO:</b>	
Osservando la dilatazione riportata sul partogramma	<b>A</b>
Dopo una fase di accertamento ostetrico osservando segni e sintomi	<b>B</b>
Dal numero di contrazioni efficaci nell'arco di 10 minuti	<b>C</b>
Dalla visita vaginale, durante l'apice della contrazione	<b>D</b>
<b>Quesito n. 7</b>	<b>Risposta</b>
<b>LE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO PER UNA DISFUNZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO POSSONO ESSERE:</b>	
Modifica dello stile di vita e trattamento comportamentale	<b>A</b>
Allenamento dei muscoli del pavimento pelvico, stimolazione elettrica funzionale e biofeedback	<b>B</b>
Farmacologico e chirurgico	<b>C</b>
Tutte le risposte precedenti	<b>D</b>
<b>Quesito n. 8</b>	<b>Risposta</b>
<b>CON L'ENTRATA IN VIGORE DI QUALE NORMATIVA L'OSTETRICA PERDE LA DENOMINAZIONE DI 'PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA' E DIVENTA 'PROFESSIONE SANITARIA'?</b>	
Decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 'Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania'	<b>A</b>
Legge 9 dicembre 1977, n. 903 'Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro'	<b>B</b>
Legge 26 febbraio 1999, n.42 'Disposizioni in materia di professioni sanitarie'	<b>C</b>
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n.740 'Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o	<b>D</b>
<b>Quesito n. 9</b>	<b>Risposta</b>
<b>L'ALLATTAMENTO MATERNO PRODUCE MOLTEPLICI BENEFICI TRA CUI:</b>	
La diminuzione di casi di anemia materna	<b>A</b>
La diminuzione di casi di anemia fetale	<b>B</b>
La diluizione dell'emoglobina fetale	<b>C</b>
Nessuna delle precedenti	<b>D</b>
<b>Quesito n. 10</b>	<b>Risposta</b>
<b>PER CERCARE L'ORIGINE DEL SANGUINAMENTO NELLA EMORRAGIA POST PARTUM (EPP) SI UTILIZZA LA REGOLA DELLE 4 T, DOVE T STA PER:</b>	
Tono trauma trombina trazione	<b>A</b>
Tono trauma tessuti trombina	<b>B</b>
Tono tachicardia trombina trazione	<b>C</b>
Tono trauma tessuti tachicardia	<b>D</b>

## PROVA SCRITTA N. 1

Quesito n. 11	Risposta
<b>UNA DONNA CHE VUOLE RICHIEDERE UN CERTIFICATO DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA PUO' RIVOLGERSI SECONDO LA LEGGE 194 DEL 1978:</b>	
Solo ai consultori familiari accreditati	<b>A</b>
Solo ai consultori familiari pubblici	<b>B</b>
Ad un qualsiasi medico di fiducia non obiettore	<b>C</b>
Sia ai consultori familiari che agli ospedali pubblici	<b>D</b>
Quesito n. 12	Risposta
<b>UN NEONATO ITERICO SOTTOPOSTO ALLA FOTOTERAPIA DEVE ESSERE ESPOSTO ALLA LUCE:</b>	
Vestito, senza particolari protezioni	<b>A</b>
Nudo, senza particolari protezioni	<b>B</b>
Nudo, con una benda a protezione degli occhi	<b>C</b>
Nudo, coperto solo con un lenzuolo	<b>D</b>
Quesito n. 13	Risposta
<b>L'ETÀ GESTAZIONALE AL MOMENTO DELL'ESPOSIZIONE AD UN FARMACO POTENZIALMENTE TERATOGENO:</b>	
E' dato fondamentale per stabilire se c'è stato un rischio	<b>A</b>
Non cambia il rischio malformativo associato al farmaco	<b>B</b>
E' importante se la gestante ha assunto il farmaco nelle prime tre settimane di gravidanza	<b>C</b>
Non è indicativa rispetto al rischio	<b>D</b>
Quesito n. 14	Risposta
<b>RIGUARDO ALLE DECELERAZIONI VARIABILI, QUALE DI QUESTE AFFERMAZIONI È FALSA:</b>	
Sono presenti anche in assenza di contrazioni uterine	<b>A</b>
Si verificano indipendentemente dalle contrazioni	<b>B</b>
Graduale caduta della FCF e recupero con ritorno alla linea di base	<b>C</b>
Sono sempre dopo la contrazione	<b>D</b>
Quesito n. 15	Risposta
<b>IN GRAVIDANZA ALLA PRIMA VISITA UN RISCONTRO DI TOXO TEST CON IGG ASSENTI E IGM ASSENTI E' INDICE DI:</b>	
Sieroconversione per Toxoplasmosi	<b>A</b>
Quadro di immunità	<b>B</b>
Non immune alla Toxoplasmosi	<b>C</b>
E' necessario Avidity Test per comprendere e collocare il momento dell'infezione (sieroconversione)	<b>D</b>

PROVA NON ESTIMATA

19/03/24



**PROVA SCRITTA N. 2**



Quesito n. 1	Risposta
<b>È POSSIBILE VACCINARE CONTRO L'INFLUENZA STAGIONALE UNA DONNA CHE ALLATTA AL SENO?</b>	
Si ma non è raccomandato	<b>A</b>
Si, ma è consigliabile solo alle madri di neonati prematuri	<b>B</b>
Si, è fortemente raccomandato	<b>C</b>
Non ci sono indicazioni sicure	<b>D</b>
Quesito n. 2	Risposta
<b>PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO PER IL DNA FETALE SECONDO LE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA SALUTE:</b>	
la donna esegue un prelievo venoso	<b>A</b>
la donna esegue un prelievo venoso ed un' ecografia office	<b>B</b>
la donna deve prima eseguire una consulenza con il genetista	<b>C</b>
Il NIPT deve essere collegato e preceduto da un accurato controllo ecografico dopo l'XI settimana	<b>D</b>
Quesito n. 3	Risposta
<b>CON L'ACRONIMO MEOWS SI INTENDE?</b>	
Un sistema di allerta che permette di identificare il tipo di risposta da attivare, in termini di tempi (frequenza di rilevazione/monitoraggio) e di modi (livello di allerta)	<b>A</b>
La rilevazione dei parametri vitali in una scala a punteggio che consente una veloce e condivisa valutazione dello stato clinico	<b>B</b>
Un sistema di allerta precoce per cogliere tempestivamente i segnali di deterioramento clinico in campo ostetrico	<b>C</b>
Tutte le precedenti risposte	<b>D</b>
Quesito n. 4	Risposta
<b>L'OTTICA POSITIVA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE:</b>	
L'attitudine ad essere chiamati a rispondere ad una qualche Autorità di una condotta riprovevole	<b>A</b>
Lo stimolo, l'impegno a mantenere un comportamento congruo e corretto ad attivarsi e ad assumere iniziative di volta in volta necessarie	<b>B</b>
L'impegno a confidare nelle attività svolte dai professionisti, colleghi del medesimo turno	<b>C</b>
Il dovere dell'ostetrica a comparire di fronte all'Ordine Professionale	<b>D</b>
Quesito n. 5	Risposta
<b>IN UN TRAVAGLIO DI PARTO CON CRITERI DI BASSO RISCHIO IL CONTROLLO DEL BENESSERE FETALE VIENE ESEGUITO (NICE, INTRAPARTUM CARE 2014, REV 2019):</b>	
Cardiotocografia continua	<b>A</b>
Auscultazione intermittente ogni 15 min dopo la contrazione per almeno un minuto, differenziando tra frequenza fetale e materna	<b>B</b>
Cardiotocografia ogni volta che la donna riferisce un aumento dell'attività contrattile uterina	<b>C</b>
Auscultazione intermittente ogni 15 min prima della contrazione	<b>D</b>

## PROVA SCRITTA N. 2

Quesito n. 6	Risposta
<b>L'ALLATTAMENTO MATERNO PRODUCE MOLTEPLICI BENEFICI MA NON CI SONO EVIDENZE CHE:</b>	
Riduca il rischio di sviluppare allergie	<b>A</b>
Riduca il rischio di autismo	<b>B</b>
Riduca il rischio di diabete e di tumori del sistema linfatico del bambino	<b>C</b>
Riduca l'incidenza di malattie respiratorie nel primo anno di vita	<b>D</b>
Quesito n. 7	Risposta
<b>CON RIFERIMENTO ALLA PREVENZIONE DEI DIFETTI DEL TUBO NEURALE SECONDO L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ', INDICARE QUALE AFFERMAZIONE È VERA:</b>	
Un corretto apporto di acido folico può ridurre il rischio di altre malformazioni, in particolare alcune cardiopatie e labiopalatoschisi	<b>A</b>
Tutte le donne in età fertile che non escludono la possibilità di una gravidanza dovrebbero assumere un supplemento vitaminico a base di acido folico di 15 mg/die	<b>B</b>
L'acido folico è un folato sintetico che non si trova in natura	<b>C</b>
E' raccomandabile l'assunzione di acido folico 4,4 mcg attraverso i preparati multi vitaminici che comprendono anche vitamina B, vitamina A e altre liposolubili	<b>D</b>
Quesito n. 8	Risposta
<b>SECONDO LE RACCOMANDAZIONI AGGIORNATE AL 2022, PER RIDURRE LA MORTALITÀ INFANTILE (SIDS), RIGUARDO LA SICUREZZA DEL NEONATO INDICARE QUALE INFORMAZIONE DATA ALLA MAMMA È VERA:</b>	
La normale culla deve essere utilizzata per brevi tragitti, se sistemata sul sedile posteriore e fissata con le cinture di sicurezza	<b>A</b>
La temperatura ambientale deve essere mantenuta attorno ai 29°C	<b>B</b>
La posizione del neonato sul fianco aumenta il rischio di Sudden Infant Death Syndrome	<b>C</b>
La condivisione del letto dei genitori è utile solo in casi di neonati prematuri	<b>D</b>
Quesito n. 9	Risposta
<b>PERCHÉ UN EVENTO SIA DEFINIBILE COME "INFORTUNIO SUL LAVORO" È NECESSARIO CHE SUSSISTANO CONTEMPORANEMENTE:</b>	
Invalità permanente, causa violenta, occasione di lavoro	<b>A</b>
Morte del lavoratore, rapporto causa-effetto, causa lavoro	<b>B</b>
Lesione, causa di lavoro, evento accidentale	<b>C</b>
Lesione del lavoratore, causa violenta, occasione di lavoro	<b>D</b>
Quesito n. 10	Risposta
<b>NELLA PRESENTAZIONE DI VERTICE L'INDICE DI PRESENTAZIONE È:</b>	
Il bregma	<b>A</b>
Il sacro	<b>B</b>
L'occipite	<b>C</b>
La radice del naso	<b>D</b>



## PROVA SCRITTA N. 2

<b>Quesito n. 11</b>	<b>Risposta</b>
<b>IL LEVONORGESTREL O "PILLOLA DEL GIORNO DOPO":</b>	
Può essere prescritta solo da un medico del SSN	<b>A</b>
Può essere prescritta solo da un medico non obiettore	<b>B</b>
Può essere prescritta solo da un ginecologo	<b>C</b>
Può essere acquistata senza prescrizione dalle donne maggiorenni	<b>D</b>
<b>Quesito n. 12</b>	<b>Risposta</b>
<b>LE LACERAZIONI VAGINO-PERINEALI DI 3° GRADO, A SEGUITO DI PARTO VAGINALE, INTERESSANO:</b>	
Mucosa, cute e sottocute	<b>A</b>
Mucosa e cute	<b>B</b>
Mucosa, cute, sottocute, piano muscolo- aponeurotico del perineo e sfintere anale	<b>C</b>
Mucosa,cute, sottocute, piano muscolo-aponeurotico del perineo, parete rettale e fossa ischio-rettale	<b>D</b>
<b>Quesito n. 13</b>	<b>Risposta</b>
<b>SECONDO LE LG SIN RIANIMAZIONE NEONATALE 2020-2025, NECESSITA DELLE SOLE CURE DI ROUTINE (FORNIRE CALORE, ASCIUGARE, VALUTAZIONE CONTINUA) IL NEONATO CHE:</b>	
Nasce a termine di gravidanza, con liquido amniotico chiaro e frequenza cardiaca regolare	<b>A</b>
Nasce a termine di gravidanza, con liquido amniotico chiaro, respira o piange	<b>B</b>
Nasce a termine di gravidanza, ha un buon tono muscolare e frequenza cardiaca regolare	<b>C</b>
Nasce a termine di gravidanza, ha un buon tono muscolare, respira o piange	<b>D</b>
<b>Quesito n. 14</b>	<b>Risposta</b>
<b>LA POPOLAZIONE ELEGGIBILE PER LO SCREENING DEL CERVICOCARCINOMA COMPRENDE LE DONNE:</b>	
Tra i 25-64 anni	<b>A</b>
Tra i 32 e 64 anni	<b>B</b>
Tutte le donne con una vita sessuale attiva	<b>C</b>
Solo le donne non vaccinate HPV	<b>D</b>
<b>Quesito n. 15</b>	<b>Risposta</b>
<b>IN MENOPAUSA E' CONSIGLIATO:</b>	
Assumere TOS preventivamente fino ai 60 anni	<b>A</b>
Consumare correttamente cibi quali latticini, cereali integrali, frutta e verdura fresca, proteine	<b>B</b>
Assumere acido folico giornalmente	<b>C</b>
Prestare attenzione alla carne poco cotta per rischio toxoplasmosi	<b>D</b>

PROVA

EST VATI

13/10/2024



**PROVA SCRITTA N. 3**



Quesito n. 1	Risposta
<b>SECONDO LA LINEA GUIDA ITALIANA PER LA GRAVIDANZA FISIOLÓGICA 2010 (AGGIORNAMENTO 2011), DURANTE L'ACCERTAMENTO OSTETRICO IN AMBITO PSICO SOCIALE LA RACCOMANDAZIONE INDICA DI:</b>	
Prestare attenzione, nel corso degli incontri prenatali a rilevare condizioni di disagio psicosociale, utilizzando con domande aperte le comuni modalità di comunicazione medico - paziente e offrendo attivamente sostegno, se necessario	<b>A</b>
Nel terzo trimestre di gravidanza, rilevare condizioni di disagio psicosociale, utilizzando con domande aperte le comuni modalità di comunicazione medico - paziente e offrendo attivamente sostegno, se necessario	<b>B</b>
Prestare attenzione, durante il primo incontro prenatale a rilevare condizioni di disagio psicosociale e , se necessario, sottoporre direttamente a test diagnostici (questionario di Edimburgo)	<b>C</b>
Prestare attenzione, durante il primo incontro prenatale, a rilevare condizioni di disagio psicosociale per identificare i casi a rischio ed inviarli allo specialista per le cure farmacologiche	<b>D</b>
Quesito n. 2	Risposta
<b>COSA SIGNIFICA LA SIGLA MPR DEL VACCINO?</b>	
Vaccinazione anti Papilloma Virus	<b>A</b>
Vaccinazione anti Malarica	<b>B</b>
Vaccino contro Morbillo, Parotite e Rosolia	<b>C</b>
Vaccino contro Malaria, Parotite e Rosolia	<b>D</b>
Quesito n. 3	Risposta
<b>LA LINEA GUIDA ISS-SNLG (N° 26) "EMORRAGIA POST PARTUM: COME PREVENIRLA, COME CURARLA" AGGIORNAMENTO 2020, DEFINISCE "EMORRAGIA PRIMARIA DEL POST PARTUM MAGGIORE" LA PERDITA EMATICA:</b>	
Compresa tra 500 ml e 800 ml	<b>A</b>
Superiore a 1500 ml	<b>B</b>
Superiore a 1000 ml	<b>C</b>
Superiore a 800 ml	<b>D</b>
Quesito n. 4	Risposta
<b>IN GRAVIDANZA ALLA PRIMA VISITA UN RISCONTRO DI CMV CON IGG ASSENTI E IGM ASSENTI E' INDICE DI:</b>	
Sieroconversione per CMV	<b>A</b>
Quadro di immunità	<b>B</b>
Non immune al CMV	<b>C</b>
E' necessario Avidity Test per comprendere e collocare il momento dell'infezione (sieroconversione)	<b>D</b>

### PROVA SCRITTA N. 3

Quesito n. 5	Risposta
<b>QUAL È L'INDICE DI BISHOP (IB) IN CUI È MAGGIORE LA PROBABILITÀ DI SUCCESSO DELL'INDUZIONE DEL TRAVAGLIO DI PARTO (LINEA GUIDA SIGO, 2022)?</b>	
IB ≤ 6	A
IB ≤ 3	B
Il successo dell'induzione aumenta in maniera proporzionale al valore di IB	C
Il successo dell'induzione aumenta in maniera inversamente proporzionale al valore di IB	D
Quesito n. 6	
<b>SECONDO IL 'CODICE INTERNAZIONALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO' PER 'SOSTITUTO DEL LATTE MATERNO' SI INTENDE:</b>	
Qualsiasi alimento che venga commercializzato o comunque rappresentato come idoneo a sostituire parzialmente o totalmente il latte materno, che sia adatto o meno a tale scopo	A
Esclusivamente il latte liquido commercializzato o comunque rappresentato come idoneo a sostituire parzialmente o totalmente il latte materno, che sia adatto o meno a tale scopo	B
Esclusivamente il latte in polvere commercializzato o comunque rappresentato come idoneo a sostituire parzialmente o totalmente il latte materno, che sia adatto o meno a tale scopo	C
Qualsiasi alimento, sia prodotto industrialmente che preparato localmente, adatto come complemento del latte materno o delle formule per lattanti	D
Quesito n. 7	Risposta
<b>IN TRAVAGLIO DI PARTO LA FORMAZIONE DI UNA VOLUMINOSA E ALLUNGATA BORSA DELLE ACQUE CHE SUPERA IL CANALE CERVICALE FINO A RAGGIUNGERE IL PIANO DELLA VULVA DEVE FAR PENSARE A :</b>	
Sofferenza fetale	A
Liquido amniotico tinto	B
Malposizione	C
Polidramnios	D
Quesito n. 8	Risposta
<b>NELL'AMBITO DELL'EBM LA REVISIONE SISTEMATICA E':</b>	
Un processo organizzativo e gestionale per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie	A
Un database di raccolta dati	B
Un mezzo informatico per accedere alle informazioni scientifiche	C
Una pubblicazione secondaria	D
Quesito n. 9	
<b>SECONDO "WHO INTRAPARTUM CARE FOR A POSITIVE CHILDBIRTH EXPERIENCE" SI RACCOMANDA DI SOMMINISTRARE A TUTTI I NEONATI:</b>	
3 mg di vitamina K per via intramuscolare	A
1 mg di vitamina K per via orale	B
3 mg di vitamina K per via orale	C
1 mg di vitamina K per via intramuscolare	D

### PROVA SCRITTA N. 3

Quesito n. 10	Risposta
<b>SECONDO IL MINISTERO DELLA SALUTE, IL BABY BLUES:</b>	
Coinvolge il 70-80% delle puerpere	A
Colpisce la donna immediatamente dopo il parto	B
Scompare spontaneamente in tempi brevi	C
Tutte le risposte sono corrette	D
Quesito n. 11	Risposta
<b>SECONDO LA RACCOMANDAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 6, IN MERITO ALLA PREVENZIONE PER LA MORTE MATERNA, INDICARE L'AFFERMAZIONE FALSA:</b>	
Ogni atto sanitario deve essere preceduto e accompagnato da un'esauriente azione informativa	A
Per la determinazione del profilo di rischio, riportare nella documentazione clinica i fattori biologici, ma non i fattori sociali come l'appartenenza a fede religiosa	B
La Raccomandazione principale e quella di effettuare la valutazione del rischio trombotico in occasione di ogni contatto con la struttura ospedaliera, anche per aborti interni o interruzione di gravidanza	C
Alle puerpere considerate a basso rischio tromboembolico è richiesta solo la "mobilizzazione precoce e agguerrita e attenzione allo stato di idratazione"	D
Quesito n. 12	Risposta
<b>LA DIAGNOSI DI DISTACCO FISILOGICO DI PLACENTA AVVIENE ATTRAVERSO L'INTERPRETAZIONE DI DUE SEGNI FUNICOLARI CLINICI:</b>	
Segno di Duncan	A
Segno di Ahsfield e segno di Kustner	B
Segno di Valsalva	C
Tutte le risposte sono corrette	D
Quesito n. 13	Risposta
<b>LA MANOVRA DI CRÈDÈ, ANCHE SE ESEGUITA IN MODO INTEMPESTIVO O VIOLENTO, NON PUO' PROVOCARE:</b>	
Sofferenza fetale	A
Inversione uterina	B
Aonia uterina di origine traumatica	C
Più rapida esclusione della placenta	D
Quesito n. 14	Risposta
<b>SECONDO L'OMS-UNICEF, IL LAM E' EFFICACE AL 98% SE:</b>	
La madre non ha ripreso a mestruare, la madre allatta in maniera esclusiva, il bambino ha più di 8 mesi	A
La madre non ha avuto il capoparto, la madre allatta in maniera esclusiva, il bambino ha meno di 6 mesi	B
La madre ha ripreso a mestruare, la madre allatta in maniera esclusiva, il bambino ha meno di 6 mesi	C
Tutte delle precedenti	D

### PROVA SCRITTA N. 3

Quesito n. 15	Risposta
<b>QUALE DI QUESTI E' CLASSIFICATO COME TRIGGER DELL'EVENTO PARTO (CeDAP):</b>	
Età materna superiore ai 45 anni	<b>A</b>
Ph ombelicale inferiore a 7	<b>B</b>
Parto operativo	<b>C</b>
Neonato con peso inferiore ai 2500 gr	<b>D</b>



**PROVA PRATICA N. 1**

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

Quesito n. 1	Risposta
<b>Nell'elenco delle fasi dell'esecuzione del pap test riportate qua di seguito una è falsa:</b>	
Introdurre lo speculum in vagina	<b>A</b>
Aprire lo speculum per individuare la cervice uterina	<b>B</b>
Detergere la cervice uterina con il betadine	<b>C</b>
Ruotare delicatamente la spatola di Ayre prima del citobrush	<b>D</b>
Quesito n. 2	Risposta
<b>Il candidato indichi la sequenza corretta delle fasi del Midwifery Management</b>	
Accertamento ostetrico, diagnosi ostetrica, valutazione ostetrica, pianificazione ostetrica e attuazione ostetrica	<b>A</b>
Diagnosi ostetrica, accertamento ostetrico, pianificazione ostetrica, valutazione ostetrica e attuazione ostetrica	<b>B</b>
Accertamento ostetrico, diagnosi ostetrica, attuazione ostetrica, pianificazione ostetrica e valutazione ostetrica	<b>C</b>
Accertamento ostetrico, diagnosi ostetrica, pianificazione ostetrica, attuazione ostetrica e valutazione ostetrica	<b>D</b>
Quesito n. 3	Risposta
<b>Durante la consulenza ostetrica sulla contraccezione ad una donna che allatta verrà spiegato:</b>	
Che l'allattamento al seno protegge dalle gravidanze fino al primo anno di età del bambino	<b>A</b>
Che gli unici metodi contraccettivi compatibili con l'allattamento sono i metodi barriera (profilattico e diaframma)	<b>B</b>
Che in allattamento è possibile utilizzare i contraccettivi contenenti progesterone ma non estrogeno	<b>C</b>
Che la spirale al rame è il metodo migliore per tutto il periodo dell'allattamento secondo le linee guida OMS	<b>D</b>
Quesito n. 4	Risposta
<b>Secondo la linea guida italiana per la gravidanza fisiologica 2010 (aggiornamento 2011), durante l'accertamento ostetrico in ambito psico sociale, la raccomandazione indica di:</b>	
Prestare attenzione, nel corso degli incontri prenatali a rilevare condizioni di disagio psicosociale, utilizzando con domande aperte le comuni modalità di comunicazione medico - paziente e offrendo attivamente sostegno, se necessario	<b>A</b>
Indagare, rispetto alle condizioni di disagio psico sociale, solo per pazienti con anamnesi personale e familiare positiva per problemi psichiatrici	<b>B</b>
Prestare attenzione, durante il primo incontro prenatale a rilevare condizioni di disagio psicosociale e , se necessario, sottoporre a test diagnostici (questionario di Edimburgo)	<b>C</b>
Prestare attenzione, durante il primo incontro prenatale, a rilevare condizioni di disagio psicosociale per identificare i casi a rischio ed inviarli allo specialista per la terapia farmacologica	<b>D</b>

## PROVA PRATICA N. 1

Quesito n. 5	Risposta
<b>Il bladder training:</b>	
È un allenamento specifico del muscolo pubococcigeo	<b>A</b>
È un allenamento specifico del muscolo trasverso profondo del perineo	<b>B</b>
Serve per gestire in modo corretto il riempimento e lo svuotamento vescicale, bevendo ed urinando ad intervalli programmati	<b>C</b>
Tutte le risposte precedenti	<b>D</b>
<b>Quesito n. 6</b>	
<b>Secondo le LG Intrapartum Care NICE 2023 l'ostetrica deve informare la donna:</b>	
che può seguire una dieta leggera durante il travaglio	<b>A</b>
che deve mantenere il digiuno fino alle due ore dopo il parto, ma può assumere liquidi chiari	<b>B</b>
che può seguire una dieta leggera durante il travaglio solo se si tratta di una pluripara	<b>C</b>
che può idratarsi con soluzioni isotoniche ma non deve assumere cibi solidi fino a due ore dopo il parto	<b>D</b>
<b>Quesito n. 7</b>	Risposta
<b>Le manovre di Leopold sono:</b>	
Due e si esplicano mediante l'esplorazione vaginale	<b>A</b>
Tre e si esplicano mediante la palpazione dell'addome	<b>B</b>
Quattro e si esplicano mediante la palpazione dell'addome	<b>C</b>
Quattro e si esplicano mediante l'associazione della palpazione dell'addome e dell'esplorazione vaginale	<b>D</b>
<b>Quesito n. 8</b>	
<b>La prevenzione della isoimmunizzazione RH nel post partum prevede la somministrazione di immunoglobuline (SIGO 2014):</b>	
Appena possibile, comunque entro 72 ore dal parto	<b>A</b>
Obbligatoriamente entro le prime 6 ore dal parto	<b>B</b>
Preferibilmente entro le prime 12 ore dal parto	<b>C</b>
Appena possibile, comunque entro 24 ore dal parto	<b>D</b>
<b>Quesito n. 9</b>	
<b>Un'ostetrica che consegna un referto di cotest con hpv positivo e pap test negativo:</b>	
Rassicura la donna sull'assenza di patologia e la invita a ripetere l'esame a distanza di 12 mesi	<b>A</b>
Rassicura la donna e la invia in colposcopia	<b>B</b>
Rassicura la donna e la invia in colposcopia urgente	<b>C</b>
Rassicura la donna e la invita a ripetere l'esame sospettando un inadeguato tecnico	<b>D</b>
<b>Quesito n. 10</b>	Risposta
<b>La regola delle 7 g per una corretta somministrazione di un farmaco prevede:</b>	
Giusto farmaco, giusta via di somministrazione	<b>A</b>
Giusto orario, giusto paziente, giusta registrazione	<b>B</b>
Giusta dose, giusto controllo	<b>C</b>
Tutte le precedenti	<b>D</b>





**PROVA PRATICA N. 2**

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

Quesito n. 1	Risposta
<b>Nell'elenco delle fasi dell'esecuzione delle manovre di Leopold riportate di seguito, una è falsa:</b>	
Una mano a piatto sul fondo uterino per identificarne l'altezza.	<b>A</b>
Le mani dell'ostetrica si posizionano lateralmente sull'addome materno con le dita rivolte verso l'alto. Serve per identificare su quale lato si trova il dorso del bambino.	<b>B</b>
Per la quarta manovra di Leopold l'ostetrica si pone con le spalle rivolte al volto della gestante	<b>C</b>
Indice e medio in vagina permettono di valutare il livello della parte presentata	<b>D</b>
Quesito n. 2	Risposta
<b>In un neonato in skin to skin si osserva:</b>	
Il colore della cute e delle mucose	<b>A</b>
La saturazione a livello periferico	<b>B</b>
La pressione arteriosa	<b>C</b>
Tutte le precedenti	<b>D</b>
Quesito n. 3	Risposta
<b>Nell'eseguire una consulenza preconcezionale l'ostetrica spiegherà alla donna che:</b>	
Lo spermogramma è un esame fondamentale per ipotizzare le tempistiche di concepimento	<b>A</b>
E' necessario eseguire una batteria di esami ematici tra cui i tamponi vaginali completi	<b>B</b>
Una consulenza genetica è richiedibile gratuitamente a tutte le donne sopra i 45 anni di età	<b>C</b>
Nessuna delle precedenti	<b>D</b>
Quesito n. 4	Risposta
<b>Quali parametri occorre valutare per l'assegnazione del punteggio di APGAR?</b>	
Frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura corporea, reattività agli stimoli e colorito cutaneo	<b>A</b>
Frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, tono muscolare, reattività agli stimoli e temperatura corporea	<b>B</b>
Frequenza cardiaca, pressione sanguigna, tono muscolare, reattività agli stimoli e colorito cutaneo	<b>C</b>
Frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, tono muscolare, reattività agli stimoli e colorito cutaneo	<b>D</b>
Quesito n. 5	Risposta
<b>A quale donna si proporrà l'utilizzo del DAS:</b>	
ad una donna che vuole tornare ad un allattamento esclusivo dopo un lungo periodo di separazione dal bambino	<b>A</b>
ad una donna con un incontinenza da urgenza post partum	<b>B</b>
ad una donna con un incontinenza da stress	<b>C</b>
tutte delle precedenti	<b>D</b>



## PROVA PRATICA N. 2

<b>Quesito n. 6</b>	
<b>Secondo le LG Intrapartum Care NICE2023 l'ostetrica deve informare la donna:</b>	
Che può bere durante il travaglio quando ha sete	<b>A</b>
Che l'idratazione sarà fornita per via endovenosa durante tutto il travaglio di parto	<b>B</b>
Che bere in travaglio può peggiorare la nausea ed il vomito legato legato all'utilizzo dell'ossitocina	<b>C</b>
Che l'unico liquido compatibile con il travaglio è l'acqua	<b>D</b>
<b>Quesito n. 7</b>	<b>Risposta</b>
<b>Secondo le LG Intrapartum Care NICE 2023 per un donna con epidurale nel secondo stadio del travaglio è utile consigliare:</b>	
La posizione di decubito laterale sinistro diminuirà la pressione percepita della parte presentata	<b>A</b>
Solo la posizione eretta può favorire la discesa della parte presentata	<b>B</b>
Sdraiarsi su un fianco può aumentare le possibilità di un parto vaginale spontaneo	<b>C</b>
Le posizioni erette in questo stadio sono da evitare perchè potrebbero causare un alterazione del BCF	<b>D</b>
<b>Quesito n. 8</b>	<b>Risposta</b>
<b>Secondo l'OMS/L'UNICEF, i segni di un attacco adeguato al seno sono:</b>	
Bocca del neonato ben aperta, mento che tocca il seno, labbro superiore estroflesso, più areola mammaria visibile sotto che sopra la bocca del neonato	<b>A</b>
Bocca del neonato ben aperta, mento che tocca il seno, labbro inferiore estroflesso, più areola mammaria visibile sopra che sotto la bocca del neonato	<b>B</b>
Bocca del neonato ben aperta, mento che tocca il capezzolo, labbro inferiore estroflesso	<b>C</b>
Bocca del neonato ben aperta, mento che tocca il seno, labbro inferiore introflesso	<b>D</b>
<b>Quesito n. 9</b>	
<b>Per strumentare un intervento di taglio cesareo l'ostetrica deve:</b>	
Lavare le mani e indossare cuffia, camice e guanti sterili	<b>A</b>
Lavare le mani e indossare guanti sterili	<b>B</b>
Indossare la cuffia, lavare mani e avambracci, indossare camice e guanti sterili	<b>C</b>
Lavare le mani e indossare guanti non sterili	<b>D</b>
<b>Quesito n. 10</b>	<b>Risposta</b>
<b>Quali sono i 5 momenti dell' OMS per l'igiene delle mani?</b>	
Prima di toccare un pz, prima di entrare nella stanza di degenza, dopo il rischio/esposizione ad un liquido biologico, dopo aver toccato un pz, dopo aver toccato ciò che è intorno al pz	<b>A</b>
Prima di toccare un pz, prima di una procedura pulita/asettica, dopo il rischio/esposizione ad un liquido biologico, dopo aver toccato un pz, dopo aver toccato ciò che è intorno al pz	<b>B</b>
Prima di toccare un pz, prima di una procedura pulita/asettica, dopo il rischio/esposizione ad un liquido biologico, dopo aver toccato un pz, dopo essere usciti dalla stanza di degenza	<b>C</b>
Tutte delle precedenti	<b>D</b>



**PROVA PRATICA N. 3**

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

Quesito n. 1	Risposta
<b>Nell'elenco delle fasi dell'esecuzione dell' esplorazione vaginale riportate qua di seguito una è falsa:</b>	
Durante l'esplorazione vaginale in travaglio di parto l'ostetrica valuta la discesa della parte presentata	<b>A</b>
Durante l'esplorazione vaginale in travaglio di parto l'ostetrica valuta la temperatura interna della donna	<b>B</b>
Durante l'esplorazione vaginale in travaglio di parto l'ostetrica valuta la dilatazione del collo dell'utero	<b>C</b>
Durante l'esplorazione vaginale in travaglio di parto l'ostetrica valuta la rottura del sacco amniotico ed il colore del liquido amniotico	<b>D</b>
Quesito n. 2	Risposta
<b>In un neonato in skin to skin per valutare il benessere si osserva:</b>	
L'idratazione a livello delle sclere	<b>A</b>
La frequenza del pianto vigoroso	<b>B</b>
Il tono muscolare	<b>C</b>
Tutte le precedenti	<b>D</b>
Quesito n. 3	Risposta
<b>Secondo le LG Intrapartum Care NICE 2023 se una donna con infusione di ossitocina ha più di 4 contrazioni in 10 minuti:</b>	
Si ha la certezza che il travaglio sta procedendo rapidamente	<b>A</b>
E' necessario ridurre o interrompere l'infusione ossitocica	<b>B</b>
E' indice di distocia meccanica	<b>C</b>
Tutte le precedenti	<b>D</b>
Quesito n. 4	Risposta
<b>Secondo le LG "GRAVIDANZA FIOLOGICA" (Aggiornamento 2011),lo strumento dell'ostetrica misurazione sinfisi - fondo:</b>	
La distanza fondo uterino-sinfisi pubica deve essere misurata e registrata solo all'ultima visita prenatale	<b>A</b>
Va eseguita a partire da 34+0 settimane di età gestazionale	<b>B</b>
La distanza fondo uterino-sinfisi pubica deve essere misurata e registrata ad ogni visita prenatale, a partire da 24+0 settimane di età gestazionale	<b>C</b>
Tutte le precedenti	<b>D</b>
Quesito n. 5	Risposta
<b>Nell'elenco delle fasi del posizionamento del catetere vescicale riportate qua di seguito una è falsa:</b>	
Detersione dei genitali esterni	<b>A</b>
Individuazione del meato uretrale	<b>B</b>
Inserimento del catetere fino al raggiungimento della parete vescicale posteriore	<b>C</b>
Posizionamento della sacca di raccolta	<b>D</b>

### PROVA PRATICA N. 3

<b>Quesito n. 6</b>	
<b>Secondo le linee guida 2022 "SLEEP-RELATED INFANT DEATHS: UPDATED 2022 RECOMMENDATIONS FOR REDUCING INFANT DEATHS IN THE SLEEP ENVIRONMENT" riguardo la sicurezza del neonato indicare quale informazione sarà data dall'ostetrica</b>	
Il materasso dovrebbe essere morbido e accogliente	<b>A</b>
La temperatura ambientale deve essere mantenuta superiore ai 25°C	<b>B</b>
Il neonato dovrebbe essere posizionato supino quando riposa	<b>C</b>
Il fumo è accettabile, tranne nella stanza dove riposa il neonato	<b>D</b>
<b>Quesito n. 7</b>	<b>Risposta</b>
<b>In quale delle seguenti manovre di Leopold, l'ostetrica volge il dorso alla gestante</b>	
Seconda	<b>A</b>
Terza	<b>B</b>
Quarta	<b>C</b>
Prima	<b>D</b>
<b>Quesito n. 8</b>	<b>Risposta</b>
<b>In un travaglio di parto con caratteristiche di basso rischio il controllo del benessere fetale viene eseguito (NICE, INTRAPARTUM CARE 2014, REV 2019):</b>	
Cardiotocografia continua	<b>A</b>
Auscultazione intermittente ogni 15 min dopo la contrazione per almeno un minuto, differenziando tra frequenza fetale e materna	<b>B</b>
Cardiotocografia ogni volta che la donna riferisce un aumento dell'attività contrattile	<b>C</b>
Auscultazione intermittente ogni 15 min prima della contrazione	<b>D</b>
<b>Quesito n. 9</b>	
<b>Dopo il posizionamento di BAKRI BALLOON l'ostetrica dovrà osservare:</b>	
Se il neonato è correttamente attaccato al seno	<b>A</b>
La presenza di eventuali ulteriori perdite ematiche	<b>B</b>
Il riflesso rotuleo	<b>C</b>
La colorazione delle sclere materne	<b>D</b>
<b>Quesito n. 10</b>	<b>Risposta</b>
<b>Durante l'incontro prenatale l'ostetrica deve informare la coppia rispetto a:</b>	
L'importanza dell'assunzione di almeno 10 mg/die di acido folico associato a vitamina C	<b>A</b>
La necessità di sospendere qualsiasi attività lavorativa in telelavoro	<b>B</b>
L'importanza del riposo a letto nei primi tre mesi di gravidanza per la prevenzione dell'aborto del primo trimestre	<b>C</b>
La differenza tra screening prenatale e diagnosi prenatale	<b>D</b>

PROVA NON ESTRATTA *Lorella Anna*  
22/03/24



**Prova orale n. 1**

Il candidato risponda al seguente quesito

<b>Quesito n.1</b>
Che cos'è il Pap Test, quando e come viene eseguito?

<b>Quesito n.2</b>
Cosa garantisce l'assistenza One to One in travaglio ?

**Prova di lingua straniera**

Advise low-risk multiparous women that planning to give birth at home or in a midwifery-led unit (freestanding or alongside) is associated with a lower rate of interventions and the outcome for the baby is no different compared with an obstetric unit.

**Prova di Informatica**

Quando è in corso una operazione di Input cosa si intende?

1. Immissione dati
2. Emissione dati
3. Elaborazione dati
4. Cancellazione dei dati

PROVA ORALE ESTRATTA GRUPPO N°2

22/03/24 *Elisa Prota*

**Prova orale n. 2**



Il candidato risponda al seguente quesito

**Quesito n.1**

Quali sono i dieci passi dell'allattamento secondo OMS?

**Quesito n.2**

Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quando è indicata l'assunzione di acido folico, quale dosaggio è consigliato perché sia efficace e a cosa serve?

**Prova di lingua straniera**

There is uncertainty about the most effective drug treatments and dosage regimes, and about which other treatments should be used, for women who develop a postpartum haemorrhage. The most effective sequencing of interventions is also uncertain.

**Prova di Informatica**

Le memorie di massa consentono di:

1. Scrivere un testo
2. Effettuare calcoli
3. Stampare un testo
4. Registrare grandi quantità di dati in modo permanente

### Prova orale n. 3

Il candidato risponda al seguente quesito



#### Quesito n.1

Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quali sono le raccomandazioni che il professionista deve fornire alla donna fumatrice?

#### Quesito n.2

Quali sono i principali metodi contraccettivo post ivg?

### Prova di lingua straniera

Carry out the following observations of the woman after birth:•record her temperature, pulse, blood pressure and respiratory rate,check uterine contraction and lochia,examine the placenta and membranes: assess their condition, structure, cord vessels and completeness.

### Prova di Informatica

Qual è la differenza tra EMAIL e PEC?

*Luigi Ferraro*



**Prova orale n. 4**

Il candidato risponda al seguente quesito

<b>Quesito n.1</b>
Quali sono le principali metodiche non farmacologiche per il contenimento del dolore in travaglio attivo?

<b>Quesito n.2</b>
Chi, quando e come viene attribuito l'Indice di Apgar?

**Prova di lingua straniera**

The two critical neonatal outcomes were neonatal mortality and morbidity. Other important outcomes included growth, cognitive development and breastfeeding status. The guidelines address timing, number and place of postnatal contacts, and content of postnatal care for all mothers and babies during the six weeks after birth

**Prova di Informatica**

Per una call tra professionisti si può utilizzare?

1. Excel
2. Teams
3. Word pad
4. Netscape communicator



**Prova orale n. 5**

Il candidato risponda al seguente quesito

**Quesito n.1**

Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quali sono i fattori di rischio tali per cui l'ostetrica può consigliare la curva da carico di glucosio (OGTT) precocemente in gravidanza tra 14 e 18 settimane?

**Quesito n.2**

Quali sono i parametri che si osservano per l'interpretazione di un tracciato cardiocografico di una donna in travaglio?

**Prova di lingua straniera**

Give the woman information about the extent of the trauma, pain relief, diet, hygiene and the importance of learning to do pelvic floor exercises, what to expect as they recover, and where and when to seek advice or psychological support if needed.

Quale sequenza di tasti si utilizza per effettuare un operazione di Copia e Incolla

1. ALT+C, ALT+V
2. CTRL+C, CTRL+V
3. ALT+C, CTRL+V
4. CTRL+C, INVIO